

Betteraves sucrières

Données du réseau : observations réalisées par le CETA VAL de MORGE, le CETA LIMAGNE, le SRAL Auvergne, la Sucrierie de BOURDON et le Centre Technique Betteravier des Limagnes.

Observations Teignes

3 pièges sont installés à Reignat, Charmes et Cognat-Lyonne, observés chaque semaine.

Les pluies des 13, 14 et 16, suivies d'un rafraîchissement, ont ralenti fortement les vols de papillons. 1 teigne à Reignat, 1 à Charmes et 6 à Cognat-Lyonne. Il n'y a pas de larves au cœur des betteraves. Les interventions sont nécessaires après 10 % des plantes parasitées.

Maladies foliaires

10 parcelles sont observées chaque début de semaine.

Nos observations de cette semaine montrent une légère progression des tâches de cercosporiose (entre 0 et 29%) et la présence d'oïdium (1% dans 2 parcelles)

Le seuil de traitement pour la cercosporiose est de 5 % pour la première intervention et entre 15 et 20% pour la seconde.

Pour les variétés dites tolérantes à la cercosporiose, une expérimentation est en cours pour valider un premier traitement vers un seuil de 15 à 20 % : l'objectif étant de réduire le nombre de traitements.

Noctuelles défoliatrices

Après une forte attaque dans certaines parcelles fin juin, pour l'instant il n'y a pas de développement de chenilles et de dégâts sur les feuilles. Le seuil d'intervention est à 50% des feuilles montrant des morsures récentes.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Auvergne, rédigé par le Cetiom, Arvalis et la Draaf-Sral, en collaboration avec les Chambres d'Agriculture de l'Allier, du Puy de Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal, Clb, Coopaval, Domagri, Ets Cassier, Limagrain, Ets Chassin, Jeudy SA, Sica Bb, Sarl Bastin, les lycées de Marmilhat, Neuvy, Durdal-Larequille et Le Breuil/ Couze, Ets Combronde, Tardif, Tivagrain, Phytosem, Descreaux, Dodat, Coopaca, Thivat Venuat, Fredon, Agrisudest Centre, Altitude, Equation, Coop Eurea, le Ceta Val de Morge, le Ceta Limagne et des agriculteurs.

Mais

Données du réseau : 10 parcelles ont fait l'objet d'au moins une observation sur la période du 20 et 21 juillet 2009.

Stades des cultures : de floraison mâle à floraison femelle.

Observations Pyrales

La baisse des captures et des pontes se poursuit. Au cours des deux prochaines semaines, une faible activité de la pyrale peut encore se produire.

Les premiers dégâts (casse de panicule) devraient être observés rapidement.

Bilan des captures

Dpt	Lieu	Date première capture	Captures de la semaine	Captures totales	Pontes observées
03	Escurolles	22 juin		62	
	Rongères	9 juin		9	
	La Ferte-Hauterive	21 juin		17	
	Le Mayet-d'Ecole	18 juin	5	7	1 / 50 plantes
	Monteignet sur l'Andelot	16 juin		11	
	Cindré	26 mai		15	
	St-Martin des Lais	27 mai		3	
	St-Pourcain sur Besbre	8 juin		14	
	St-Pourcain sur Sioule	8 juin		5	
63	Isle-et-Bardais	20 mai		14	
	Lempdes	29 juin		3	
	Lezoux	15 juin	0	11	0 / 50 plantes
	Maringues	22 juin	0	34	0 / 50 plantes
	St Beauzire	7 juillet	0	1	0 / 50 plantes
	Villeneuve-les-cerfs	15 juin	15	30	0 / 50 plantes
	Espirat	22 juin	2	17	0 / 50 plantes
	Gignat	15 juin	6	22	0 / 50 plantes
	Bussièrès-et-Pruns	08 juin	2	23	0 / 50 plantes
	Mirefleurs	7 juillet	0	8	1 / 50 plantes
Le Cheix sur Morge	18 juin	12	15	7 / 50 plantes	

Sauf actualité sanitaire exceptionnelle, ce message est le dernier message maïs de la campagne.

Au cours des prochaines semaines, et si vous observez des dégâts de pyrales importants, vous pouvez contacter votre technicien et effectuer un comptage de larves de pyrales sur 50 plantes.

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui donnent des tendances régionales. La Chambre Régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Directeur de Publication: Jacques Chazalet, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture
 Coordonnées référent: François Roudillon (CA 03) - froudillon@allier.chambagri.fr 04-70-48-42-42
 Publication Hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation