

Bulletin de santé du végétal - Auvergne

N° 5 du 29 Juin 2010

LE STADE DE LA CULTURE au 15 juin 2010

Secteur en dessous de 900 m.	La lentille est au stade pleine floraison à début formation du grain dans les 2 premiers étages de gousses
Secteur au dessus de 900-1000 m.	La lentille est au stade apparition du bouton floral dit «stade torche » à pleine floraison

Les conditions météorologiques chaudes des derniers jours ont permis un développement rapide de la culture. Mais le retard de développement est toujours de 8 à 15 jours.

L'ETAT SANITAIRE DE LA CULTURE :

Les conditions météorologiques actuelles, semblables à celles de mai 2009, sont propices à l'installation des maladies.

Les maladies parasites

La rouille brune : à ce jour le réseau de parcelles d'observation fait apparaître les premiers symptômes sur le secteur de Bains – Vergezac. Les attaques sont observées sur des lentilles en floraison issues de semis précoces. Le seuil de nuisibilité, de 3 pustules de rouilles brune et plus, présentes sur feuilles ou tiges est atteint. La pression et les dégâts de la rouille ont été gravissimes sur ces secteurs en 2009.

Les conditions climatiques chaudes et orageuses de cette semaine sont favorables aux sporulations et contaminations de **la rouille** ..

Les ravageurs de la culture :

La Cécidomyie de la lentille est à surveiller à partir du stade 12 Feuilles de la culture. Le réseau de piégeage est en place. Les relevés effectués entre 1 juin et 29 juin sur 6 parcelles font apparaître une très faible intensité des vols. Les captures cumulées sont entre 0 et 13 sur cette période, alors que le seuil de nuisibilité est pour l'instant fixé à plus de 300. Le risque est très faible pour l'instant et il est nul sur les zones à moins de 1000 m. car le stade sensible est dépassé. Sur les zones de plus de 1000.m. le réseau d'observation suivra dans les prochains jours.

Le puceron vert est toujours présent dans certaines parcelles depuis plusieurs jours, mais pas d'évolution par rapport à la semaine dernière.

La Tordeuse du pois : Le réseau d'observation est en place sur les zones à moins de 1000 m. sur des parcelles au stade formation des gousses. Les premiers relevés au 29 juin, font apparaître les vols d'adultes (papillons) sont assez conséquent. A suivre dans les jours suivants.

Vous devez surveiller et visiter vos parcelles au minimum une fois par semaine.

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui donnent des tendances départementales. La Chambre Régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Auvergne, rédigé par la Chambre d'Agriculture de Haute-Loire par délégation pour le CILVERPUY.

Directeur de Publication : Jacques Chazalet, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture
Coordonnée référent : Bernard DAUDET C.A. 43 Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

